

شركة راع فارما

لصحة حيوان أفضل



FOR VETERINARY PHARMACEUTICALS

بوفيلان ٢٠٪ حقن - ١٠٠ مللي

التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
تايلوزين ٢٠٠ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

مضاد حيوي قوي يستخدم للتحكم وعلاج:
١- اعتلال الجهاز التنفس في الأبقار
(الحمى والالتهاب الرئوي)
والتي غالباً يكون سببها الباستيريلا
مالتوسيدا او الاكتينيو مايسيس بايجينز.
٢- تغفن الحافر.
٣- التهاب الرحم بسبب الاصابه.
باليكتينومايسيس بايجينز.
٤- التهاب الضرع.



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
فلونكسين ملجمونين ٨٣ مليجرام
مكافف لفلونكسين قاعدي ٥٠ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

مسكن قوى ، خافض للحرارة، مضاد للالتهاب
ومضاد للسموم ويستخدم لعلاج:
١- الالتهاب والألم.
٢- الأمراض التنفسية في الماشية.
٣- التهاب الضرع في الأبقار.
٤- صدمة التسمم بالسموم البكتيرية.
٥- المرض في الخيول.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

بالحقن في العضل أو الوريد
ماشية وأغنام:
١ مللي / ٤٥ كجم من وزن الجسم مرة واحدة يومياً ولدنة ٥ أيام.
خيول:
١ مللي / ٤٥ كجم من وزن الجسم مرة واحدة يومياً ولدنة ٣ أيام.

فاميزيول ٧,٥٪ حقن - ١٠٠ مللي



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
ليفاميزول هيدروكلوريد ٧٥ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

مضاد للديدان يستخدم للتحكم في عدوى
الديدان الاسطوانية في الأبقار والغنم (الديدان
البالغة والغير بالغة) مثل :
١- الالتهاب المعوي الطفيلي بسبب فصائل
(ترياكوكستروجليس ، كوكوبيريا ، الاوستراتجيا ،
هييمونكس ، نيماتوديرس ، بونوستومام ،
اوسيفوجيوستومام و شيباريتا).
٢- الديدان الرئوية (داكتينوكلاس).

الجرعة وطريقة الإعطاء:

بالحقن خت الجلد
الأبقار والأغنام:
١ مللي / ١٠ كجم من وزن الحيوان.

فلوكليس ٣٤٪ حقن - ٥٠ مللي - ١٠٠ مللي



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
نيتروكسينيل ٣٤٠ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

مضاد للديدان يستخدم لعلاج:
١- الاصابة بالفاشيولا (الطور البالغ
والغير بالغ الكبير) من فاشيولا هيباتيك.
٢- بعض الديدان الجوف معويه مثل الديدان
المستيرية.
٣- عدوى الهيمونكس والبارافيلاريا بوفيكولا .
٤- عدوى الاسوفيجيوستومام رادياتام
والبونوستومام فليبيوتومام في الأبقار.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

بالحقن خت الجلد
الأبقار والأغنام:
١,٥ مللي / ٥٠ كجم من وزن الحيوان.

مايكوسبيكتين

حقن - ١٠٠ مللي



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
لينكومايسين هيدروكلوريد ٥١,٧
يكافو لينكومايسين قاعدي ٥٠
سيكتينومايسين سلفات تراهيدرات ١٥١,٢
يكافو سيكتينومايسين قاعدي ١٠٠
مليجرام

طريقة العمل:

تركبته منظورة وقوية من الينكومايسين وسيكتينومايسين تعمل كمضاد واسع المجال ضد البكتيريا السالبة والموجبة لصبغة جرامعن طريق ثنيط تصنيع البروتين داخل الخلية البكتيرية.

دواعي الاستعمال:

الأبقار: الالتهاب الرئوي المصحوب بالالتهاب المعوي.

الأغنام والماعز: العدوى البكتيرية التنفسية بالملوك وبلازما والمصحوبة بتعفن الخافر.

القطط والكلاب: العدوى التنفسية - العدوى الجلدية - علاج المخزاري والجروح بسبب البكتيريا اللاهوائية - عدوى الجهاز البولي - الالتهاب المعوي.

الجرعة: بالحقن العضلي


الأبقار: ١ مللي / ٠١ كجم وزن الحيوان مرتين يومياً أول يوم تتبع بمرة واحدة يومياً لمدة ٤-٦ أيام.

الأغنام والماعز: ١ مللي / ٠١ كجم وزن الحيوان مرة واحدة يومياً لمدة ٣ أيام.

القطط والكلاب: ١ مللي / ٠٥ كجم وزن حيوان تكرر بعد ١٢ - ١٤ ساعة لمدة تمتد إلى ١١ يوم.

أنثيزول ١٪

تجريء - ١ لتر



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
آلبندازول ١٠٠ مليجرام

طريقة العمل وداعي الاستعمال:

مضاد للديدان يستخدم في التحكم وعلاج الديدان الجوف معاوية المستدية في الأبقار والأغنام والماعز والخيول والدواجن مثل :

- الديدان المستدية (هيمنوكس، اوستريجيها).
- الديدان الرئوية (داكتيوكولاس).

- الديدان الشرطية (موبيزيا).
- ديدان الكبد المفاطحة (الطور البالغ للفاشيوغا).

الجرعة وطريقة الإعطاء:

الأبقار:

ديدان مستدية وشرطيه ١,٥ ملي / ٤٠ كجم وزن حيوان.
ديدان كبدية ومستدية ٢ ملي / ٤٠ كجم وزن حيوان.

الأغنام:

مستدية وشرطيه ١٠٠ ملي / ٤٠ كجم وزن حيوان.


ديدان كبدية ومستدية ١,٥ ملي / ٤٠ كجم وزن حيوان.

الدواجن:

١ لتر ٥ طن وزن حم.

إنتريوسيللين ٢٠٪

حقن عميق ٣٠ مللي - ١٠٠ - ١٠٠ مللي



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
أوكسي تراسيسيللين قاعدي ٢٠٠ مليجرام

طريقة العمل

وداعي الاستعمال:

مضاد حيوي واسع المجال يستخدم للتحكم وعلاج الاصابة بالملکروبات الحساسة لمدة

الاوکسی تراسیسللین مثل حالات :

- الالتهاب الرئوي المصحوب بالحمى بسبب الباستيريلا والهيموفيليس.
- الالتهاب المعوي البكتيري بسبب الايشيريشيا كولاي.
- حالات اللسان التخشب بسبب الاكتينوباسيلاس ليجنيريزياي.
- الاصابة باللبيتوسيبرا.
- عدوى الجروح والتهاب الرحم بسبب الاستافيلوكوكاتي والستربتوكوكاتي.


الجرعة وطريقة الإعطاء:

بالحقن العضلي العميق
الأبقار والأغنام:

١ مللي / ٠١ كجم وزن حيوان وتكرر بعد ٤-٦ أيام عند الضرورة.

إنتريوسيللين ٥٪

حقن - ١٠٠ مللي



التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
أوكسي تراسيسيللين هيدروكلورايد ٥٠ مليجرام

طريقة العمل

وداعي الاستعمال:

مضاد حيوي واسع المجال يستخدم للتحكم وعلاج الاصابة بالملکروبات الحساسة لمدة

الاوکسی تراسیسللین مثل حالات :

- الالتهاب الرئوي المصحوب بالحمى بسبب الباستيريلا والهيموفيليس.
- الالتهاب المعوي البكتيري بسبب الايشيريشيا كولاي.

٣- حالات اللسان التخشب بسبب الاكتينوباسيلاس ليجنيريزياي.

٤- عدوى التهاب وتعفن الخافر بسبب الكولستريديا.

٥- الاصابة باللبيتوسيبرا.

٦- الاصابة بالانابلازما (انابلازما مارجينال).

٧- الاصابة بالجمرة الخبيثة (باسيلاس انثراسيس).

٨- عدوى الجروح والتهاب الرحم بسبب الاستافيلوكوكاتي والستربتوكوكاتي.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

بالحقن العضلي او بالوريد

الابقار والأغنام: ٢ مللي / ٠١ كجم وزن حيوان لمدة ٥-٣ أيام.

آرثنيل ٢٠٪ حقن - ١٠٠ مللي

التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
فينيل بيوتاوزون ٢٠٠ مليجرام
صوديوم سالسيلات ٢٠ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

مسكن، مضاد للالتهاب ، خافض للحرارة ومضاد للروماتيزم لعلاج:

- ١- انتلالات الجهاز العضلي الهيكلي مثل: التهاب المفاصل ، التهاب الأوتار والأربطة والعرج.
- ٢- الألم الجسدي أو المعوي (المغص).
- ٣- مرض القم والفم (الحمى القلاعية).
- ٤- حمى سرعة الزوال.

الجرعة وطريقة الاعطاء:

الماشية والجمال والخيول:
٢٠ - ٣٠ سم / للحيوان.
أول يومين ويتبع بنصف الجرعة في اليومين التاليين.
الأغنام ، الماعز، الأمهور، العجول والخنازير:
٥ - ١ سم / للحيوان.
أول يومين ويتابع بنصف الجرعة في اليومين التاليين.



كيورا ديكساميثازون ٢٠٪ حقن - ١٠٠ مللي

التركيب:

كل ١ مللي يحتوي على:
ديكساميثازون قاعدي ٢٠ مليجرام

طريقة العمل و دواعي الاستعمال:

هو نظير اصطناعي لمركب بريدينسلون وله قدرة مشابهة ولكن أكثر فاعليه كمضاد التهاب علاجي والذي يستخدم في علاج:

- ١- الكيتوزيه.
- ٢- الصدمة.
- ٣- حمى اللبن.
- ٤- التهاب المفاصل.
- ٥- الربو وتفاعلات الحساسية.

الجرعة وطريقة الاعطاء:

بواسطة الحقن العضلي أو خت الجلد
الماشية والخيول:

٥ - ١٥ سم / للحيوان.

عجل، أغنام و ماعز :

١ - ٢,٥ سم / للحيوان.



شركة راع للمستحضرات البيطرية

فيلا (٥٠) شارع (٤٥) التجمع الخامس - الحي (٣) القاهرة الجديدة - القاهرة
تلفاكس : ٢٥٦٢٨٧٢٨ - ٢٣٠٢٠٢٣٠٢٣٧٥٦ محمول : ٠٠٢٠٢٣٠٢٣٧٥٦

الرقم البريدي : ١١٨٣٥
بريد إلكتروني : raapharma@hotmail.com